

**EL TiLV
solo afecta
a las
tilapias**



**No afecta
a otras
especies**



Somos el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, encargado de supervisar y fiscalizar todas las actividades pesqueras y acuícolas en el Perú, para que los productos hidrobiológicos y sus derivados sean sanos, inocuos y aptos para el consumo humano, en resguardo de la salud pública.

**Solicita más información
en las oficinas de SANIPES
de tu región**



- **TARAPOTO** » Urb. Baltazar Martínez de Compagnon Mz. A Lote 3 Tercer Piso Morales San Martín, Tarapoto, San Martín. » Tel: 042 524247
- **SECHURA** » A.H Vicente Chunga Aldana Mz. B Lote 18 Sechura Piura » Tel: 073 377272
- **PAITA** » Mz. B Lote 34 2da Etapa FONAVI Urb. Isabel Barreto, Paita, Piura. » Tel: 073 214448
- **CHIMBOTE** » Urb. Mariscal Luzuriaga Mz. C Lote 13 Edificio Magan Tercer Piso Nuevo Chimbote, El Santa, Ancash » Tel: 043 417224
- **LIMA** » Sede Surquillo: Domingo Orué N° 165, piso 7, Surquillo Lima, Perú » Tel: 051 2138570 / Sede Callao: Carretera a Ventanilla Km. 5.2, Callao Perú » Tel: 051 7150180

Ayúdanos a controlar el TiLV. Escríbenos a:
enfermedades.acuaticos@sanipes.gob.pe

www.sanipes.gob.pe

EL PERÚ PRIMERO



PERÚ
Ministerio
de la Producción



**Ante la
presencia
del Virus de
la Tilapia
Lacustre (TiLV)...**

SANIPES te orienta



El Virus de la Tilapia Lacustre (TiLV) es responsable de la muerte masiva de tilapias silvestres y de cultivo en diferentes partes del mundo. SANIPES viene aplicando un plan de emergencia que incluyen acciones preventivas y de asistencia en las zonas donde se desarrolla la actividad de cultivo de esta especie.

**¿Cómo reconocer el
virus en las tilapias?**



**Recomendaciones para
evitar y enfrentar el virus**



No trasladar tilapias de un centro acuícola a otro.



Evitar la sobrepoblación de tilapias en los estanques para evitar el estrés.




Restringir las visitas al centro acuícola. En caso de ingreso, utilizar ropa descartable y calzado desinfectado.



Los materiales y equipos deben de ser de uso exclusivo y desinfectados antes y después de usar.



La mortalidad debe ser recogida diariamente y colocada en una poza con cal.



Utilizar mallas de protección en los estanques de cultivo para evitar el ingreso de animales.



**¿Qué debes hacer si tienes
mortalidad en tu centro de cultivo?**

Recolecta la mortalidad diariamente y colócala en recipientes exclusivos con tapas para evitar derrames.

Considera estas opciones para la disposición final de la mortalidad:

1. Encalado

- Implementa una poza de mortalidad (de una profundidad mínima de 2 mt.) alejada de los estanques y/o lagunas.
- Agrega cal sobre la mortalidad (1 kg. de cal por cada 10 kg. de peces) y mantén tu poza tapada.

2. Incinerado

- Transporta la mortalidad en envases cerrados hasta el lugar de incineración.

3. Ensilado químico

- En un área exclusiva de ensilaje químico, muele la mortalidad y, por ejemplo, añádele ácido fórmico al 85% (3.5 l de ácido fórmico por cada 100 Kg. de peces) hasta alcanzar un pH de 4.

El Virus de la Tilapia Lacustre infecta a:



Huevos fertilizados y larvas



Alevines



Juveniles



Adultos y reproductores